

A termék rövid leírása

A Kupzit® új fejlesztésű rézcitrát preparátum a bor, a gyümölcsbor, valamint más erjedési termékek kénhidrogén szag (bakszag) jellegű illathibáinak eltávolítására. A Kupzit® 2% rézcitrátot tartalmaz, és a könnyű adagolás és kezelés érdekében ásványi hordozóanyagra, tiszta, értékes bentonitra vitték fel, és granulálták.

A jelenleg hatályos EU-s rendeletek és irányelvek szerint engedélyezett, tisztaság és minőség tekintetében szaklaboratóriumban bevizsgált termék.

A kezelési cél

A Kupzit® gyorsan és specifikusan reagál a kéntartalmú, kellemetlen illatú vegyületekkel, mint a kénhidrogén és a merkaptánok. Ezeket anélkül csapja ki, hogy - helyes adagolás esetén - a réztartalom az italban észrevehetően emelkedne.

Adagolása és alkalmazása

Az optimális kezelés céljából minden esetben előkísérletek végzését javasoljuk. Általában az adagolás 5-20 g / 100 l, különleges esetekben 50 g / 100 l vagy e fölötti (az adott országban érvényben lévő előírásokat figyelembe kell venni). Beadagolás előtt 1:10 arányban kell borban feloldani. A kezelendő mennyiséghez adagolva ügyeljen a jó elkeverésre. A kezelőanyag néhány perc alatt kifejti hatását. A keletkezett derítési alj leválasztását szűrővel 1-2 napon belül el kell végezni.

A réztartalom zavaró növekedése rendeltetésszerű használat mellett nem, vagy csak csekély mértékben következik be. Ezért a Kupzit®-tal történő kezelés után a legtöbb esetben nem szükséges külön kékderítés.

Alkalmazható egyedileg vagy kombinált derítéssel, vagy Böcksinnel együtt is lehetséges. A kombinált derítés során a Kupzit®-ot elsőként kell adagolni.

Tárolása

A Kupzit®-ot nedvesség-, fény- és szaghatásoktól óvni kell. A felbontott csomagokat gondosan zárjuk vissza.

Különleges megjegyzések

Az eddig alkalmazott bakszagot kezelő anyagokkal összehasonlítva a Kupzit® tulajdonságai a következők:

- a Kupzit® biotikus termék,
- a Kupzit®-ban levő citromsav megfelel a borban természetesen előforduló citromsavnak,
- a Kupzit®-nak nagy a reakcióspecifikussága,
- a Kupzit® a bakszagot okozó anyagokkal észlelhető rézfelesleg nélkül reagál,
- emiatt többnyire nem szükséges utólagos kékderítés,
- ezüstionokat nem viszünk be,
- hatássprektuma összevethető az ezüst-klorid preparátumokkal,
- a granulált struktúra miatt kezelése és adagolása egyszerű.

Termékismertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre, ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözőek, ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak. Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 2014.04.03.